

Số: 247 /KH-UBND

*Xuân Đông, ngày 07 tháng 10 năm 2026*

**KẾ HOẠCH**

**Tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 02  
năm 2026 trên địa bàn xã Xuân Đông**

Căn cứ Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 31/3/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản trên địa bàn tỉnh (nay là thành phố Đồng Nai) năm 2026;

Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-SNNMT ngày 02/10/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai về tiêm phòng các bệnh cho gia súc, gia cầm Đợt 2/2026 trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026;

Căn cứ Văn bản số 802/CCCNTS-TH ngày 02/10/2026 của Chi cục Chăn nuôi thủy sản thành phố Đồng Nai về việc tiêm phòng các bệnh cho gia súc, gia cầm Đợt 2/2026 trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026.

UBND xã Xuân Đông xây dựng Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2026 trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

- Tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm và duy trì mức kháng thể bảo hộ thường xuyên trong quần thể vật nuôi để phòng bệnh từ đó làm cơ sở xây dựng vùng an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu.
- Chủ động phòng, chống, kiểm soát các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm, hạn chế sự lây lan của mầm bệnh và ngăn ngừa việc phát sinh dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi, không để bệnh Cúm gia cầm (CGC) có nguy cơ lây sang người, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

**2. Yêu cầu**

- Tổ chức tiêm phòng đúng đối tượng, đúng loại vắc xin, đúng liều lượng, đúng kỹ thuật; bảo đảm an toàn cho người tham gia tiêm và vật nuôi.
- Quản lý chặt chẽ vắc xin, vật tư, sổ sách; thực hiện cấp giấy chứng nhận tiêm phòng theo quy định; thống kê, báo cáo kịp thời, chính xác.
- Phấn đấu tỷ lệ tiêm phòng đạt tối thiểu 80% tổng đàn thuộc diện tiêm; riêng đàn gia cầm tiêm phòng Cúm gia cầm đạt tỷ lệ bảo hộ từ 70% trở lên.

**II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN TIÊM PHÒNG**

**1. Đối tượng tiêm phòng**

- Gà, chim cút: Tiêm phòng vắc xin phòng bệnh CGC và Newcastle.

- Vịt, ngan: Tiêm phòng vắc xin phòng bệnh CGC và Dịch tả vịt.
- Trâu, bò: Tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng (LMLM) type O, Tụ huyết trùng, Viêm da nổi cục.
- Dê, cừu: Tiêm phòng bệnh LMLM type O; khuyến khích tiêm phòng bệnh Đậu dê.
- Heo: Tiêm phòng các bệnh LMLM type O, Dịch tả heo cổ điển.
- Chó, mèo: Tiêm vắc xin phòng bệnh Đại.

## **2. Phạm vi thực hiện**

Tất cả các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn xã.

## **3. Thời gian thực hiện**

- Từ ngày 01/10/2026 đến ngày 14/10/2026: Xây dựng kế hoạch tiêm phòng, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng về các bệnh gia súc, gia cầm và biện pháp phòng, chống bệnh, kế hoạch, thời gian tiêm phòng; bố trí tiếp nhận, bảo quản vắc xin tiêm phòng.
- Từ ngày 15/10/2026 đến ngày 04/11/2026: Triển khai tiêm phòng.
- Ngoài đợt tiêm phòng chính, tổ chức triển khai tiêm phòng bổ sung thường xuyên hàng tháng để tạo miễn dịch khép kín trên đàn gia súc, gia cầm.

## **4. Kinh phí thực hiện**

**a. Các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi trên địa bàn xã:** Có trách nhiệm phải tự tổ chức tiêm phòng các bệnh bắt buộc theo quy định.

**b. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức tiêm phòng như sau:**

- Bệnh VDNC trâu, bò: Tiêm phòng cho đàn trâu, bò chăn nuôi quy mô nông hộ trên địa bàn xã.
- Bệnh Đại trên động vật:
  - + Tiêm phòng cho đàn chó, mèo của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.
  - + Tiêm phòng bổ sung cho đàn chó, mèo trên địa bàn xã có phát sinh ổ dịch năm 2026 (nếu có).

## **c. Nguồn kinh phí**

Nguồn kinh phí từ ngân sách chi cho công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2026 trên địa bàn thành phố Đồng Nai theo phân cấp tại Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 31/3/2026, trong đó:

- Kinh phí thành phố: Vắc xin: Cúm gia cầm, Viêm da nổi cục, Đại.
- Kinh phí xã bố trí: Công tiêm phòng, xăng xe cho người tham gia tiêm phòng, các vật tư phục vụ công tác tiêm phòng (đá bảo quản vắc xin, cồn sát

trùng, bông gòn, xà phòng, đèn pin, áo mưa, in giấy chứng nhận tiêm phòng... vợt chuyên dụng bắt chó).

### **5. Quy trình tiêm phòng: (Phụ lục đính kèm)**

## **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Phòng Kinh tế xã**

- Tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai, báo cáo kết quả thực hiện tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm đợt 02 năm 2026.

- Phối hợp với Trạm chăn nuôi và thủy sản khu vực 5 trực tiếp chỉ đạo tổ chức tiêm phòng các loại vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn xã quản lý theo quy định.

- Thành lập các tổ tiêm phòng gồm thú y viên, cán bộ ấp, đoàn viên thanh niên ấp chịu trách nhiệm trực tiếp triển khai tiêm phòng, ghi chép sổ sách, cấp giấy chứng nhận tiêm phòng và báo cáo kết quả hàng ngày.

- Xây dựng lịch tiêm phòng cụ thể cho từng ấp.

- Theo dõi sát tình hình dịch bệnh, phản ứng sau tiêm; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND xã và cơ quan chuyên môn các biện pháp xử lý khi có bất thường xảy ra.

### **2. Phòng Văn hóa - Xã hội xã và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã**

Đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, loa truyền thanh các ấp, thông qua các cuộc họp dân; thông báo, nhắn tin qua các nhóm Zalo; mạng xã hội,... về mục đích, ý nghĩa của việc tiêm phòng; thời gian, địa điểm, đối tượng và chính sách hỗ trợ tiêm phòng để người dân biết, chủ động phối hợp.

### **3. Ban nhân dân các ấp**

- Lập danh sách các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, đăng ký chính xác số lượng gia súc, gia cầm; các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ nhốt vật nuôi tại chuồng trại, bắt giữ, dôn nhốt vật nuôi để phục vụ công tác tiêm phòng thuận lợi, an toàn.

- Thông báo trước cho người dân ít nhất 02 ngày để sắp xếp vật nuôi; ưu tiên tiêm trước cho các đàn gia súc, gia cầm khu vực có nguy cơ cao.

### **4. Cộng tác viên thú y**

- Việc bảo quản, vận chuyển và sử dụng vắc xin thực hiện đúng quy định, bảo đảm luôn trong dây chuyền lạnh từ 2-8°C; chỉ sử dụng vắc xin còn hạn, được bảo quản, pha, sử dụng theo đúng hướng dẫn nhà sản xuất và cơ quan Thú y; bơm, kim tiêm phải được tiệt trùng, xử lý sau sử dụng đúng quy định về an toàn sinh học và bảo vệ môi trường.

- Thú y viên xã phối hợp trưởng ấp lập sổ sách, phiếu theo dõi tiêm phòng; ghi chép cụ thể từng hộ, từng loại vật nuôi, số lượng, ngày tiêm, loại vắc xin, số lô vắc xin...; cấp giấy chứng nhận tiêm phòng cho các hộ theo quy định.

- Thực hiện Quy trình kỹ thuật tiêm phòng từng loại bệnh thực hiện theo hướng dẫn tại phụ lục của Kế hoạch tiêm phòng của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

### **5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã**

- Phối hợp tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm; vận động hội viên, đoàn viên gương mẫu thực hiện, tích cực tham gia hỗ trợ lực lượng tiêm phòng khi được yêu cầu.

Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 02 năm 2026 trên địa bàn xã Xuân Đông. Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện/.

#### **Nơi nhận:**

- Như mục III;
  - Sở Nông nghiệp và Môi trường;
  - Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản;
  - Trạm Chăn nuôi và Thủy sản KV5;
  - Chủ tịch, các PCT UBND xã;
  - Chánh, Phó CVP HĐND - UBND xã;
  - Lưu: VT, NNMT.
- (Nhưng)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Chiến**

## Phụ lục

### HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH TIÊM PHÒNG

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng 10 năm 2026  
của UBND xã Xuân Đông)

#### 1. Bệnh Cúm gia cầm: Vắc xin cúm gia cầm NAVET-FLUVAC 2.

Vắc xin Cúm gia cầm (CGC) vô hoạt nhũ dầu NAVET-FLUVAC 2 chứa 2 chủng vi rút vắc xin H5N1 là NIBRG - 14 và A/Hubei/1/2010 (H5N1)-PR8-IDCDC-RG30. Vắc xin được sản xuất bằng cách nuôi cấy các chủng vi rút trên vào phôi trứng gà 9-10 ngày tuổi và được làm vô hoạt bằng formalin. Vắc xin ở dạng nhũ dịch, đồng nhất, màu trắng ngà. Vắc xin tạo miễn dịch nhanh sau 02 tuần tiêm vắc xin và độ dài miễn dịch được 6 tháng.

**1.1. Đối tượng tiêm phòng:** Gà, vịt, ngan (vịt xiêm).

#### 1.2. Quy trình tiêm phòng

- Đường tiêm: tiêm dưới da cổ (1/3 phần dưới, sau cổ); lắc kỹ chai vắc xin trước khi tiêm cho gia cầm. - Gà, vịt, ngan (vịt xiêm) từ 14 - 21 ngày tuổi, liều 0,3 - 0,5ml/con; trường hợp tiêm ở 14 ngày: gà, vịt, ngan, được tiêm nhắc lại sau mũi tiêm đầu 10-14 ngày, liều 0,5ml/con.

- Gà, vịt, ngan trên 21 ngày tuổi, gà giống, gà đẻ, vịt giống, vịt đẻ: liều 0,5ml/con.

#### 1.3. Bảo quản

Bảo quản và vận chuyển vắc xin ở nhiệt độ 2 - 8°C, không để vắc xin vào ngăn đông, tránh ánh sáng trực tiếp.

#### 1.4. Lưu ý

- Không dùng vắc xin cho gia cầm có biểu hiện bệnh.  
- Trước khi dùng, để vắc xin đạt đến nhiệt độ phòng một cách tự nhiên.  
- Lắc kỹ lọ vắc xin trước khi sử dụng.  
- Không dùng lọ vắc xin có hiện tượng bị vỡ, nứt, mất nhãn, nhãn không có số lô - ngày sản xuất - hạn sử dụng hoặc đã hết hạn sử dụng, có hiện tượng tách pha nước.

- Tiêm đúng vị trí hướng dẫn; tránh tiêm vào mạch máu và tránh đâm kim tiêm vào xương cổ của gia cầm.

- Sau khi mở, lọ vắc xin chỉ sử dụng trong 24 giờ.

- Thường xuyên thay kim trong khi tiêm vắc xin.

- Thời gian ngưng sử dụng: ngưng sử dụng vắc xin cho gia cầm 14 ngày trước khi giết mổ.

#### 2. Bệnh Newcastle (nhược độc đông khô)

##### 2.1. Đặc tính

- Vắc xin nhược độc dạng đông khô được sản xuất từ virus Newcastle chịu nhiệt chủng AVF/HR-NDV.

- Vắc xin rất an toàn ngay cả đối với gà con mới nở, tạo miễn dịch nhanh và đồng đều.

- Chủng virus này có tính chịu nhiệt cao và khả năng truyền ngang mạnh, có thể sử dụng bằng phương pháp nhỏ mắt, uống hoặc cho ăn nên thích hợp với đàn gà nuôi thả vườn, nơi thường thiếu các phương tiện lạnh để bảo quản vắc xin

## **2.2. Thành phần**

- Mỗi liều vắc xin chứa ít nhất 106EID50 virus Newcastle nhược độc chủng AVF/HR-NDV.

- Chất ổn định: Sữa không kem.

**2.3. Chỉ định:** Dùng để phòng bệnh Newcastle (Dịch tả gà hay bệnh gà rù) cho gà mọi lứa tuổi, khỏe mạnh.

**2.4. Cách sử dụng:** Có thể sử dụng bằng 3 phương pháp

- Nhỏ mắt, mũi: Pha loãng vắc xin bằng nước sinh lý mặn vô trùng hoặc dung dịch pha vắc xin hoặc nước sạch, đã làm mát với lượng sao cho đủ một gà con 2 giọt, lắc tan đều. Tùy thuộc ống nhỏ giọt (để tính lượng nước pha vắc xin cho phù hợp nên kiểm tra trước số giọt/1ml của ống nhỏ giọt trước khi dùng), thông thường mỗi 1 ml vắc xin đã pha có thể nhỏ cho 8 đến 10 con.

- Cho uống: Pha vắc xin như nhỏ mắt, mũi rồi nhỏ vào miệng gà mỗi con hai giọt; Cả đàn: Dùng nước sạch không chứa Chlor, Ion kim loại nặng hoặc các chất sát trùng pha vắc xin mỗi lượng vừa đủ mỗi con từ 5 -10 ml tùy theo lứa tuổi. Trước khi cho uống vắc xin, cho gà nhịn khát từ 1- 2 giờ để bảo đảm gà thu nhận hết lượng vắc xin. Máng uống phải để trong bóng râm.

- Cho ăn: Pha loãng vắc xin với 10 ml nước sạch, trộn đều với lưng bát cơm nguội hoặc thức ăn hỗn hợp (tính khoảng 10g/gà) rồi dàn đều trên mẹt hoặc bao giấy để cho toàn bộ đàn gà cùng ăn một lúc vào sáng sớm khi đang đói. Máng ăn phải để trong bóng râm.

## **2.5. Chú ý**

Không dùng chai vắc xin đã bị nứt, bật nắp, mất nhãn, nhãn không có số lô - ngày sản xuất – hạn sử dụng hoặc đã hết hạn sử dụng, bánh đông khô bị teo.

## **2.6. Bảo quản**

Ở nhiệt độ từ 2 - 8°C, không để vắc xin vào ngăn đông, tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp. Có thể để vắc xin ở nơi khô mát, trong bóng râm được hai tuần. Vắc xin đã pha loãng để nơi mát, trong bóng râm được 3 ngày.

## **3. Bệnh Viêm da nổi cục (VDNC)**

### **3.1. Vắc xin LUMPYVAC**

- **Đặc tính, thành phần:** vắc xin đông khô, chủng Neethling cho trâu, bò, vắc xin chứa ít nhất 103.5TCID<sub>50</sub> trên một liều.

- **Chỉ định:** tạo miễn dịch phòng bệnh VDNC trên trâu, bò.

- **Hướng dẫn sử dụng, liều dùng:** vắc xin đông khô hòa với nước pha mát (nước muối sinh lý), lắc kỹ vắc xin đã pha loãng và tiêm dưới da; Trâu, bò: 2ml/con; Thời gian miễn dịch ít nhất là 12 tháng, không cần tiêm liều tăng cường.

- **Bảo quản:** bảo quản nhiệt độ từ 2 - 8°C, tránh ánh sáng.

- **Lưu ý:** sử dụng lọ vắc xin đã mở trong vòng 2 giờ. Sau khi hoàn thành xong việc tiêm chủng, loại bỏ tất cả các chai rỗng và chất chứa còn lại theo quy định.

### 3.2. Vắc xin nhược độc đông khô AVAC LSD LIVE

- **Thành phần:** mỗi liều vắc xin chứa tối thiểu 103.5TCID<sub>50</sub> vi rút viêm da nổi cục (LSD) nhược độc chủng Neethling và chất ổn định đông khô.

- **Chỉ định:** vắc xin Avac LSD Live được chỉ định tiêm cho trâu, bò để tạo miễn dịch phòng bệnh viêm da nổi cục. Sau tiêm 3 tuần, trâu bò có khả năng miễn dịch với vi rút viêm da nổi cục, thời gian bảo hộ kéo dài tối thiểu 12 tháng.

- **Đường dùng và cách dùng:**

+ Pha vắc xin đông khô với dung dịch Avac Diluent được cung cấp kèm theo. Không pha vắc xin với dung dịch khác.

+ Tiêm dưới da.

- **Liều lượng và liệu trình:** Mỗi liều vắc xin sau khi pha là 2 ml.

+ Tiêm phòng lần đầu: Bê, nghé từ con mẹ đã được tiêm phòng: tiêm vào lúc 4 - 6 tháng tuổi. Bê, nghé từ con mẹ chưa tiêm phòng: tiêm ở mọi lứa tuổi.

+ Tiêm phòng nhắc lại: hàng năm.

- **Tác dụng phụ:** sau khi tiêm, một số rất ít gia súc có thể có biểu hiện sưng nhẹ tại vị trí tiêm, thân nhiệt tăng nhẹ. Phản ứng đó sẽ tự mất đi sau vài ngày mà không cần can thiệp.

- **Chú ý:**

+ Chỉ tiêm phòng cho gia súc khỏe.

+ Vắc xin an toàn cho cả trâu, bò mang thai.

+ Không tiêm đồng thời hoặc kết hợp với vắc xin khác. Tiêm cách vắc xin khác tối thiểu 7 ngày.

+ Không tiêm cho gia súc đang sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch.

+ Vắc xin đã pha phải sử dụng trong vòng 2 giờ.

+ Dùng dụng cụ sạch và vô trùng để pha và tiêm vắc xin.

+ Không dùng lọ vắc xin đã bị rạn nứt, biến màu và hết hạn sử dụng.

- **Bảo quản:** Bảo quản ở 2 - 8°C, tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp.

### 4. Bệnh Đại: Vắc xin BIORABIES

**4.1. Thành phần:** vi rút đại vô hoạt được nuôi cấy trong hệ thống tế bào BHK.

**4.2. Chỉ định:** Tạo miễn dịch chủ động chống lại bệnh dại ở chó và mèo.

**4.3. Liều lượng:** Tiêm 01 ml dưới da cho thú nuôi từ 12 tuần tuổi trở lên. Tiêm nhắc lại mỗi năm một lần. Trong trường hợp có các chiến dịch tiêm phòng dại, thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

**4.4. Bảo quản:** Ở nhiệt độ từ 2 - 8°C. Tránh tiếp xúc với nhiệt độ cao, ánh nắng mặt trời hoặc đông đá.

**4.5. Thận trọng:** Không sử dụng nếu sản phẩm chuyển sang màu vàng.